

Tildeling af Magnesium ved dyrkning af stivelseskartofler

Delrapport 2018

AKV Langholt



Skrevet af:

Henrik Pedersen og Claus Nielsen

AKV Langholt AmbA

Gravsholtvej 92

9310 Vodskov

Indhold

Resumé	3
Baggrund.....	4-6
Gennemførelse af forsøg	6
Resultater	7
Konklusion.....	8
Bilag.....	9


Resumé

Målet med projektet er at finde optimal magnesium-tildeling til stivelseskartofler. Traditionelt anvendes primært patentkali til gødskning af kartofler, og herved tilføres kartoflerne en stor mængde magnesium. En stigende andel af arealet grundgødes i dag med protamylasse, som kun indeholder en beskedne mængde magnesium, hvilket nødvendiggør supplerende tilførsel af magnesium. Forsøg ved Karup Kartoffelmølsfabrik (KAF-projekt) har vist, at der også kan være betydelig negativ effekt ved tildeling af magnesium. Det er derfor vigtigt at få vurderet kartoflernes magnesium-behov ved anvendelse af protamylasse for at undgå utilsigtet overgødsning.

Årets forsøg vil indeholde to forsøg (Ytteborg og LandboNord) og være med fire forskellige tildelinger af magnesium.

Baggrund

I en forsøgsserie foretaget af Karup Kartoffelmelsfabrik i årene 2015-2017 blev der fundet en negativ effekt ved at tilføre ekstra magnesium til stivelseskartofler.



Resultatet var meget overraskende, idet der i mange år ikke har været arbejdet med magnesium til kartofler, og idet der ikke tidligere har været påvist negativ effekt i dette omfang.

En stigende del af arealet med stivelseskartofler gødes med protamylasse, hvis magnesiumindhold er lavt. Dette betyder, at der bliver suppleret med magnesium i f.eks. Kieserit, hvor kg-prisen for magnesium er relativt høj. Der vil her kunne overgødes med magnesium, som kan medføre negativt merudbytte og spildte omkostninger til magnesium.

Det kan også tænkes, at anvendelse af patentkali kan føre til overgødsning med magnesium i de marker, hvor kalitalle er lave.

Der er kort sagt behov for en undersøgelse, der dokumenter magnesiumbehovet i stivelseskartofler.

Formål med undersøgelsen

At finde optimal magnesium-tildeling til stivelseskartofler, hvor kaligødsning er foretaget med protamylasse/K-2.

Beskrivelse af projekt 2018

GRUNDBEHANDLING: Forsøget grundgødtes med kalium i form af K2/ Protamylasse efter gældende kaliumnorm. Derudover grundgødskes med N og P som i den omgivende mark, og som normalt for stivelseskartofler. Der må ikke tilføres anden K og Mg end forsøgsbehandlingerne.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:

Faktor 1: Gødning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Ved lægning	Ingen Mg	
2	15-04-2018 Ved lægning. Mg-mængden er inklusive Mg udbragt med protamylassen givet under grundbehandling	25 kg Mg	Kieserit
3	15-04-2018 Ved lægning. Mg-mængden er inklusive Mg udbragt med protamylassen givet under grundbehandling	50 kg Mg	Kieserit
4	15-04-2018 Ved lægning. Mg-mængden er inklusive Mg udbragt med protamylassen givet under grundbehandling	75 kg Mg	Kieserit

Eksempel på gødningsplan fra forsøg hos AKV Langholt

Led	N	P	K	Mg	S	Kr/ha
1	170	31	151	9	26	2.151
2	170	31	151	25	48	2.417
3	170	31	151	50	81	2.816
4	170	31	151	75	114	3.215

Kartoffelmarkens behov for tilførsel af magnesium på baggrund af magnesiumtallene.

Mgt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kg Mg	35	25	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0

Kartoffelmarkens behov for Mg via handelsgødning afhænger primært af jordens Mg-tal og det forventede udbytt niveau.

Kartofler indeholder ca. 0,9 g Mg pr. kg tørstof. Ved et forventet

udbytt niveau på 450 hkg melkartofler kan man således forvente, at planterne bortfører ca. 10 kg

Mg. I en almindelig frugtbar dansk jord med normale Mg-tal mellem 4 og 8 opnås normalt ikke

merudbytte for at tildele mere end 10 kg Mg pr. ha.

Gennemførelse af forsøg

Undersøgelserne i 2018 hos AKV. 1 landsforsøg 4 led 4 gentagelser

Undersøgelserne i 2018 hos KMC. 1 landsforsøg 4 led 4 gentagelser

Resultater 2018

AKV 2018 Kt 10,1. Mg 4,6					
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater					
led	UDB. OG MER- UDB. hkg stivelse	UDB. OG MER- UDB. hkg knolde	STIVELSE % af råvare	PLANTEBE- STAND 1.000 planter/ha	PLANTEFARVE karakter 0-10
1	110,1	574,8	19,2	41,2	3
2	6,9	15,1	19,8	41	3
3	3,9	2,9	19,7	40,9	3
4	3	6,1	19,4	40,5	4

Ytteborg Kt 5,8 Mg 3,8					
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater					
led	UDB. OG MER- UDB. hkg stivelse	UDB. OG MER- UDB. hkg knolde	STIVELSE % af råvare	PLANTEBE- STAND 1.000 planter/ha	PLANTEFARVE karakter 0-10
1	117,8	560,6	21	46,6	1
2	1,2	17	20,6	46,9	1
3	0,1	13,8	20,6	44,2	1
4	-11,1	-40,8	20,5	46,1	1

Stigende mængde Mg til kartofler, ved samme kalitildeling

2 forsøg 2018				
led	Mg tilførsel *)	S tilførsel	hkg knolde/ha	hkg stiv/ha
1	10	36	568	114
2	25	57	584	118
3	50	92	576	116
4	75	125	550	110

*) 10 kg i Protamylasse + 0/15/40/65 kg mg i kieserit

Konklusion

Resultaterne i de to forsøg passer meget godt med de gamle Mg normer. Skulle man følge dem, er den optimale mængde Mg til de to forsøgsarealer 15kg Mg/ha.

Der er også en klar tendens til, at hvis man tilfører for meget Mg, koster det udbytte.

I en tidligere forsøgsserie fra 2015-2017 foretaget af KMC var det tydeligt, at ved at gå fra 4:1 til 8:1 i forholdet mellem kali og magnesium var det muligt at øge udbyttet.

Dette forsøg viser, at tildeling af magnesium har stor betydning for udbyttet, men at man ikke kan angive et fast forhold mellem magnesium og kali i den tildelte gødning, idet jordens indhold af de to stoffer skal indregnes i forholdstallet.

Der giver derfor god mening at tildele Mg efter de gamle normer. Og der er en risiko for nedsat udbytte ved overgødsning med magnesium. Dette kunne også skyldes, at der så også tilføres rigtigt meget svovl.

Bilag